

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

平成23年3月14日

カリウム補給剤

グルコンサンK錠 5mEq

グルコンサンK錠 2.5mEq

グルコンサンK細粒 4mEq/g

(一般名：グルコン酸カリウム)

「使用上の注意」改訂のお知らせ

製造販売元 株式会社ポーラファルマ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社の標記製品につきまして「使用上の注意」を改訂しましたので、ご案内いたします。

つきましては、今後のご使用に際しましては、改訂内容に充分ご留意ください。

なお、改訂後の「使用上の注意」全文につきましては、改訂添付文書をご参照ください。

今後とも、御愛顧、御指導を賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

敬白

(改訂内容および改訂理由については裏面をご覧ください)

■改訂内容（ _____ : 改訂・追記部分）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略			省略		
非ステロイド性消炎鎮痛剤（以下略）	省略	省略	非ステロイド性消炎鎮痛剤（以下略）	省略	省略
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意すること。	グルコン酸カリウムによる血清カリウム値の上昇とドロスピレノンの抗ミネラルコルチコイド作用によると考えられる。	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	高カリウム血症を誘発することがあるので、血清カリウム値を観察するなど十分注意すること。	グルコン酸カリウムによる血清カリウム値の上昇とドロスピレノンの抗ミネラルコルチコイド作用によると考えられる。
※ V ₂ -受容体拮抗剤 トルバプタン等	併用した場合、血清カリウム値が上昇するおそれがある。	水利尿作用により循環血漿量の減少を来し、相対的に血清カリウム値が上昇するおそれがある。			

【改訂理由】

V₂-受容体拮抗剤である、トルバプタン（商品名：サムスカ錠 15mg、製造販売元：大塚製薬株式会社）の添付文書中に、本剤との相互作用について記載されたため自主改訂致しました。

この、「使用上の注意改訂」の内容は、DSUNo.198（4月発行）に掲載されます。

最新の医薬品添付文書改訂情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」(<http://www.info.pmda.go.jp/>)をご確認ください。