

シクロスポリンカプセル「ファイザー」を 服用される方へ

注意： 以下の場合はこの薬を服用する前に必ず医師にご相談ください

- ◆薬を服用して、かゆみ、発疹等のアレルギー症状が出たことがある。
- ◆他に薬等を服用している（薬局・薬店で買った薬、健康食品も含めて）。
- ◆妊娠中、または妊娠している可能性がある。授乳中である。
- ◆最近予防接種を受けた、もしくは近々予防接種を受ける予定がある。

服用について

この薬は、治療を受ける疾患や症状により、服用方法が変わりますので、医師に指示された服用方法を必ず守ってください。

- ◆**服用方法：**この薬は、服用する直前に包装（PTPシート）から取り出してください。指示された数のカプセルを、コップ 1 杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ◆**服用し忘れた場合：**気がついた時にできるだけ早く 1 回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は 5 時間以上間隔をあけてください。
絶対に 2 回分をまとめて一度に服用しないでください。
- ◆**誤って多く服用した場合：**すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ◆**飲みあわせ・食べあわせ**
 - この薬を服用している時にグレープフルーツジュース等[※]を飲むと、この薬の作用が強くなることが知られていますので、避けてください。
※一部の柑橘類（グレープフルーツ、ブンタン、スウィーティー等）には、この薬の作用を強める成分が含まれていますので、なるべく避けてください。
 - セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む健康食品と一緒に服用すると、この薬の作用が弱くなることが知られていますので、避けてください。
- ◆**高齢者の方へ：**特に指示を守って服用してください。
- ◆**その他：**自分の判断で服用を止めないでください。
この薬の代わりにサンディミュンを服用しないでください。

裏面も必ずお読みください。▶

服用期間中の注意

- ◆この薬は、以下の薬と一緒に服用することはできません。これらの薬を服用している場合や、これらの薬を処方された場合は必ず医師や薬剤師にお知らせください。

一緒に服用してはいけない薬剤名【一般名】等

- 生ワクチン(乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経口生ポリオワクチン、乾燥 BCG 等)
- プログラフ/グラセプター [タクロリムス*] *外用剤を除く
- リパロ [ピタバスタチン]
- クレストール [ロスバスタチン]
- トラクリア [ボセンタン]
- ラジレス [アリスキレン]
- スンベプラ [アスナプレビル]
- パニヘップ [パニプレビル]
- グラジナ [グラゾプレビル]
- バルモディア [ベマフィブラート]
- コルヒチン**

* * 肝臓または腎臓に障害がある場合

- ◆このお薬を服用している間は、かぜ等の感染症にかかりやすくなることがあるので、手洗いやうがいを行い、感染症に気をつけてください。
- ◆服用中にいつもと違う症状が現れた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

保管上の注意

- ◆服用直前まで、薬の包装（PTP シート）のまま保管してください。
この薬を包装（PTP シート）から取り出したままの状態置いておくと、薬がふやけたり破れたりして変質することがあります。
- ◆車の中や室内の高温になる場所を避けて保管してください。
- ◆直射日光を避けて保管してください。
- ◆湿度の高い場所を避けて保管してください。
- ◆包装（PTP シート）をハサミ等で切って保管する場合は、ポケット部分を切らないように注意してください。
また、服用する時は、必ず薬をアルミシートから出して服用してください。
- ◆乳幼児や小児の手の届かない場所に保管してください。
- ◆薬が残った場合は保管せず、医師または薬剤師に相談してください。
この薬を他の人にあげたり、貸したりしないでください。