

## タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」

### 【この薬は？】

販売名	タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」 Tacrolimus Ointment 0.1% 「PP」
一般名	タクロリムス水和物 Tacrolimus Hydrate
含有量 (1g 中)	1.02mg (タクロリムスとして 1mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.info.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬はアトピー性皮膚炎治療剤と呼ばれるグループに属する塗り薬です。
- ・この薬は皮膚の炎症を抑えてアトピー性皮膚炎の症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。  
**アトピー性皮膚炎**
- ・この薬は、成人に使用される塗り薬です。
- ・この薬はステロイドの塗り薬などで効果が不十分な場合や、副作用によりステロイド外用剤等が使用できない場合など、この薬による治療がより適切であると医師が判断した場合に使用されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに使用することが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○この薬との関連性は明らかではありませんが、この薬を使用した人にリンパ腫や皮膚ガンがあらわれたとの報告があります。これらの情報について十分理解できるまで説明を受けてください。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・潰瘍（かいよう）やびらん（ただれ）の部位
- ・腎臓に高度の障害のある人および高度の高カリウム血症のある人
- ・魚鱗癬様紅皮症（皮膚がうろこのようになり、剥がれ落ちたり赤くなっている）の人
- ・小児
- ・過去にタクロリムス軟膏 0.1%「PP」に含まれる成分に対し過敏症を経験したことのある人
- ・紫外線療法（PUVA療法など）を受けている人

○次の人は、原則として、この薬を使用することはできません。

- ・皮膚感染症を伴うアトピー性皮膚炎の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・腎臓に障害のある人及び高カリウム血症のある人
- ・肝臓に高度の障害のある人
- ・紅皮症の人で全身に皮疹のある人

○この薬には併用してはいけない治療法（紫外線療法）があります。

## 【この薬の使い方は？】

### ● 使用量および回数

塗る量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、1日1～2回、適量を患部に塗ります。

1回あたりの塗る量は5g（チューブ1本）までです。

- ・チューブから押し出した際に軟膏0.5gは5cm程度の長さになります。



- ・この薬を使用後、皮疹が悪化したり、2週間以内に改善しなかった場合には主治医に相談してください。

### ● どのように使用するか？

- ・患部に塗る前によく手を洗い、塗り終わったらその指をきれいに洗ってください。
- ・外陰部や粘膜などには塗らないでください。
- ・眼の周囲に塗る場合には眼に入らないように注意してください。（もし、眼に入った場合にはただちに水で洗い流してください。洗い流した後にも刺激感が持続する場合は、医療機関を受診してください。）
- ・1日2回塗る場合は、およそ12時間間隔で塗ってください。

- ・ラップなどで覆ったり、他の薬と重ね塗りしたりしないでください。

### ●塗り忘れた場合の対応

気がついた時に、できるだけ早く1回分を塗ってください。ただし、次の使用までおよそ12時間は間隔をあけてください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・重度の皮疹もしくは塗る面積が広範囲の場合は、この薬の使用開始2～4週間後に1回、その後は指示に従って腎機能検査を受けてください。
- ・この薬を塗った部分を日光にさらすのは最小限にしてください。また、日焼けランプ／紫外線ランプの使用は避けてください。
- ・この薬を塗った後、刺激感（かゆみ、ほてり感、ヒリヒリ感など）が起こることがあります。通常、皮疹の改善とともにおさまります。しかし、使用中に刺激感が強くなったり、おさまらない場合には主治医または薬剤師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 【この薬の形は？】

性状	白色～微黄色の軟膏
内容量	5g
外観	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分 (1g中)	日局 タクロリムス水和物 1.02mg (タクロリムスとして 1mg)
添加物	トリアセチン、白色ワセリン、ミツロウ

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・使用後はキャップをして保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：サンファーマ株式会社 くすり相談センター

受付時間：9：00～17：30

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）

電話番号：0120-22-6880

ホームページ：<https://jp.sunpharma.com/>