



ニトロダーム®TTS®25mgを使用されている方へ 薬の使い方

- ①この薬は、胸、腰、上腕のいずれか一ヵ所に貼って使用します。貼る場所の水分や汗をよく拭き取ってください。
- ②包装の切り口は手で破ってください。
はさみは使用しないでください。



- ③白いシールをゆっくりはがしてください。
薬はうすいだいだい色の方です。



- ④手のひら全体でしっかりと押さえてください。




裏面の注意をご覧ください。


注 意

- 医師の指示に従って使用してください。

自動体外式除細動器(AED)使用時には、本剤を除去するように、普段、よく行動と共にされる周囲の方にお知らせ下さい。また、本剤を貼る際は、電極パッドの貼付部位(右鎖骨すぐ下及び左脇下の肋骨最下部)を避けて、AEDの妨げにならないよう考慮して下さい。



- 傷や皮膚病のある場所、胸毛の部分には貼らないでください。
- 新しい薬に貼りかえる時は、前回と同じ場所を避けてください。



■ : 薬を貼る場所

* 胸、腰、上腕のいずれに貼っても、ききめに差はありません。

ニトロダーム®TTS®で治療中の方はホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤(バイアグラ®錠/レバチオ®錠、レビトラ®錠、シアリス®錠、アドシルカ®錠、ザルティア®錠)及びグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有する薬剤(アデムパス®錠)を服用しないでください。生命に関わる重い副作用を起こすことがあります。

- 使用するまでは、包装を開けず高温を避けて保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
表面の使い方をご覧ください。