

バラシクロビル錠
500mg PP

バラシクロビル錠 500mg「PP」を

服用される患者様およびご家族の方へ

服用する前に、必ずお読みください

以下のことが、1つでもあてはまる場合、診察の際に主治医にご相談のうえ、主治医・薬剤師の指示どおりに服用してください。

- 腎臓の働きが悪い（または弱い）と言われたことがある方
- 透析を受けている方
- 尿の量が少ない方（または最近、少なくなったと感じる方）
- 体がむくむ方（または最近、むくみを感じる方）
- ご高齢の方

このお薬は上記の他に脱水状態になると副作用が出やすくなります。

服用期間中は、普段より多めに水分補給をするようにしてください。

サンファーマ株式会社

服用される患者様へ

以下の症状があらわれた場合、服用を中止し、すぐに主治医・薬剤師にご相談ください。

- めまい
- ふらつき
- 頭痛
- ふるえ
- 手足のしびれ感
- けいれん
- 一時的に意識が薄れる
- 腹痛、吐き気、かゆみなどの不快な症状

おかしいな？
と感じたら、主治医・
薬剤師に相談をして
くださいね



患者様のご家族の方へ

患者様に以下の症状があらわれた場合、すぐに医療機関を受診してください。

- 意識がはっきりしない（または喪失状態）
- つじつまが合わないことを言っている
- 他の人に見えないものが見えると言っている
- てんかんの様な発作をおこしたとき

医療機関メモ

連絡先の確認にご使用ください

◎かかりつけの病院・医院

病院名・医院名	
医師名	
電話番号	
住所	

◎お薬をもらった薬局

薬局名	
電話番号	
住所	

服用メモ

服用方法の確認にご使用ください。

①1回に服用する量は？（○をしてください）

[半分 ・ 1 ・ 2] 錠

②1日に服用する回数は？（○をしてください）

[1 ・ 2 ・ 3] 回

③服用する時間は？（時間をお書きください）

[朝 _____ 時 ・ 昼 _____ 時 ・ 夜 _____ 時]

※服用するのを忘れた場合

○服用するのを1回とばして、次の服用時間から主治医・薬剤師の指示どおりに服用してください。次回の診察の際に服用を忘れたことを主治医に伝えてください。

○服用するのを忘れても1度に2回分をまとめて服用しないでください。

病医院名・薬局名