

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」を使用されている方へ

血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質 外用泡状スプレー 0.3%「PP」


- このお薬は、血行促進・皮膚保湿などの作用があります。
- 医師の指示に従い、1日1～数回適量を患部に塗布してください。



100g
容器

使用量の目安 (100g容器)

1プッシュで大人の手のひら2枚分くらいの面積*に塗ることができます。



1本で約250プッシュお使いいただけます。

*Long CC et al: Clin Exp Dermatol, 16 (6) :444-447, 1991.

! ご使用に際しての注意

- 顔や頭に使用する場合は、耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところには使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

! 取扱い上の注意

- 初めて使用する際には、容器を真っすぐに立てて3～4回空押ししてから使用してください。
- 使用後は、吐出口をティッシュなどで拭き取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところに立てて保管してください。
- 泡が出にくくなる可能性がありますので、容器は振らず、逆さにしないで使用してください。また、ポンプ部分は水洗いしないでください。


振らない



逆さにしない



水洗いしない



※容器を振ってしまい泡が出にくくなった場合は、容器を立てた状態でしばらく置いてからご使用ください。

サンファーマ株式会社

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」を使用されている方へ

血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質 外用泡状スプレー 0.3%「PP」


200g
容器



- このお薬は、血行促進・皮膚保湿などの作用があります。
- 医師の指示に従い、1日1～数回適量を患部に塗布してください。

使用量の目安 (200g容器)

1プッシュで大人の手のひら4枚分くらいの面積*に塗ることができます。



1本で約250プッシュお使いいただけます。

*Long CC et al: Clin Exp Dermatol, 16(6):444-447, 1991.

! ご使用に際しての注意

- 顔や頭に使用する場合は、耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところには使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

! 取扱い上の注意

- 初めて使用する際には、ストッパーを取り外し、容器を真っすぐに立てて4～5回空押ししてから使用してください。
- 使用した後は、吐出口をティッシュなどで拭き取り、なるべく涼しいところに立てて保管してください。
- 泡が出にくくなる可能性がありますので、容器は振らず、逆さにしないで使用してください。また、ポンプ部分は水洗いしないでください。

ストッパーを外す



振らない



逆さにしない



水洗いしない



※容器を振ってしまい泡が出にくくなった場合は、容器を立てた状態でしばらく置いてからご使用ください。

サンファーマ株式会社

2020年1月作成
HPF033DE01