

マキサカルシトール軟膏 $25\mu\text{g/g}$ 「PP」

を使用される方へ

使い方

- **1日2回**（場合によっては1回）、適量を患部に塗ってください。
- お薬を指先に出し、量を確認してから塗ってください。
- 1日の使用量はマキサカルシトール外用製剤として**10g**までです。

- ・軟膏剤のみの場合は、チューブ1本(10g)まで
 - ・このお薬と同じ成分のローション剤も一緒に使用する場合は、2種類の合計が1日の使用量(10g)を超えないよう、十分注意してください。
- ※使用部位、使用量、使用回数は医師の指示に従ってください。

使用量の目安

人差し指の第一関節から指先まで出した量は約0.5gになります。

※チューブを押し出す力により量は変わります。



注意事項

- 患部以外には使用しないでください。
- お薬にふれた手で眼、粘膜、傷口等にふれないようにしてください。
- お薬を塗り終わったあとは、手をよく洗ってください。
- このお薬の使用により、何か異常を感じた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は、お薬を使う前に必ず医師に申し出てください。
- このお薬は、他の人にあげたり貸したりしないでください。
- キャップをしめて室温で保管してください。(高温、直射日光をさけて保管してください)
- 小児の手の届かないところに保管してください。

