

タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」

【この薬は？】

販売名	タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」 Tacrolimus Ointment 0.1% 「PP」
一般名	タクロリムス水和物 Tacrolimus Hydrate
含有量 (1g 中)	1.02mg(タクロリムスとして1mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬はアトピー性皮膚炎治療剤と呼ばれるグループに属する塗り薬です。
- ・この薬は皮膚の炎症を抑えてアトピー性皮膚炎の症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

アトピー性皮膚炎

- ・この薬は、成人に使用される外用薬です。
- ・この薬はステロイド外用剤等の既存療法では効果が不十分な場合や、副作用によりステロイド外用剤等が使用できない場合など、この薬による治療がより適切であると医師が判断した場合に使用されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに使用することが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬との関連性は明らかではありませんが、この薬を使用したアトピー性皮膚炎の人にリンパ腫や皮膚ガンの発現が報告されています。患者さんはこの治療の必要性や注意すべき点等について十分理解できるまで説明を受けてください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・潰瘍やびらん（ただれ）の部位
 - ・腎臓に高度の障害のある人及び高度の高カリウム血症のある人
 - ・使用する部位が魚鱗癬様紅皮症（皮膚がうろこのようになり、剥がれ落ちたり赤くなっている）の人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・小児（小児用製剤を使用してください）
 - ・過去にこの薬に含まれる成分に対し過敏な反応を経験したことのある人
 - ・PUVA療法等の紫外線療法を受けている人
- 次の人は、原則として、この薬を使用することはできません。
 - ・皮膚感染症を伴うアトピー性皮膚炎の人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
 - ・腎臓に障害のある人及び高カリウム血症のある人
 - ・肝臓に高度の障害のある人
 - ・全身に発疹を認める紅皮症の人
- この薬には併用してはいけない治療法（紫外線療法）があります。

【この薬の使い方は？】

● 使用量および回数

塗る量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、1日1～2回、適量を患部に塗ります。

1回あたりの塗る量は5g（チューブ1本）までです。年齢により使う量が減量されます。

- ・チューブから押し出した際に軟膏0.5gは5cm程度の長さになります。



● どのように使用するか？

- ・患部に塗る前によく手を洗い、塗り終わったらその指をきれいに洗ってください。
- ・皮膚以外の部位（粘膜等）及び外陰部には塗らないでください。
- ・眼の周囲に塗る場合には眼に入らないように注意してください。（万一、眼に入った場合にはただちに水で洗い流してください。また、洗い流した後にも刺激感が持続する場合は、医療機関を受診してください。）
- ・1日2回塗る場合は、およそ12時間間隔で塗ってください。
- ・ラップ等で覆ったり、他の薬との重ね塗りなどはしないでください。

●塗り忘れた場合

気がついた時、できるだけ早く1回分を塗ってください。ただし、次の使用までおよそ12時間は間隔をあけてください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・重度の皮疹もしくは塗る面積が広範囲にわたる場合は、この薬の使用を開始してから2～4週間後に1回、その後は指示に従って腎機能検査を受けてください。
- ・この薬を使用して2週間以内に皮疹の改善が認められない場合や、皮疹の悪化がみられた場合には主治医に相談してください。
- ・症状が改善した場合には、速やかに主治医に相談してください。
- ・この薬を塗った部分を日光にさらすのは最小限にとどめてください。また、日焼けランプ／紫外線ランプの使用は避けてください。
- ・この薬を塗った後しばらくの間、かゆみ、ほてり感、ヒリヒリ感等の刺激感がよく起こります。これらの刺激感は通常は発疹の改善とともにおさまります。しかし、使用中にこれらの刺激感が強くなったり、おさまらない場合には主治医または薬剤師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

剤形	軟膏剤（5g入りのチューブ（白色のキャップ）） 
色・形状	白色～微黄色の軟膏

【この薬に含まれているのは？】

有効成分 (1g中)	日局 タクロリムス水和物 1.02mg（タクロリムスとして1mg）
添加物	トリアセチン、白色ワセリン、ミツロウ

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・使用後はキャップをして保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：株式会社ポーラファルマ (<http://www.pola-pharma.co.jp/>)

学術

電話：03-5436-2725

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）