

メーカー型新容器への包装変更及び表示変更のお知らせ

爪白癬治療剤

ルコナック[®]爪外用液5%

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、標記製品につきまして、メーカー型の新容器に包装変更することとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、変更に伴い新旧品が混在し、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白


対象製品

製品名	包装	統一商品コード	現行容器最終ロット (使用期限)	新容器変更品 初回ロット (使用期限)	切り替え 予定時期
ルコナック [®] 爪外用液 5%	3.5g(4mL)×5本	047105317	ZLXLP (2022年7月)	NLXWT (2023年1月)	2020年3月下旬
	3.5g(4mL)×10本	047105324	ZLXPP (2022年7月)	NLXAT (2023年1月)	2020年3月下旬




※各種コード、添付文書に変更はございません。

変更内容





- ① 先端部分がプッシュ型からメーカー型へ変更になります。



② シュリンク部分のフィルムの変更にあります。

現行容器	新容器
	 <div data-bbox="1193 237 1433 555" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>初回使用(開封)時 キャップをしたまま 5~10回ほど 振ってください</p>  </div> <p data-bbox="1098 566 1437 595">初回使用方法を記載いたしました。</p>

③ 患者様向け使用説明書の記載内容を改訂いたします。 ※個装箱に封入いたします。

現行容器	新容器
<div data-bbox="159 840 606 1467" style="border: 1px dashed red; padding: 10px;"> <p>ルコナック® 爪外用液5%の使い方</p> <p>ご注意ください  目には使用しないでください。  使用・保存の際には火気を避けてください。</p> <p>使用前:患部を清潔にしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 使用の都度、上向きのまま容器の先端部分を指で5~6回押し、容器の中の空気を抜きます。 <small>※空気を抜かず使用すると、容器内の圧力により薬液が多く出ることがあります。</small> 2 容器を下向きにして先端を軽く押し、薬液が出ますので、爪全体に行き渡るように塗り広げます。薬液が出にくい場合は、爪に容器の先端をさらに2~3回軽く押しください。 <small>※先端を押している間、薬液が出続けますので、注意してください。</small> 3 爪の周りの皮膚についた薬液は、ティッシュペーパーや綿棒などでふき取ってください。 4 塗り終わったら、容器の先端をティッシュペーパーなどできれいにふき取り、キャップをしめ、立てた状態で保管してください。 <p style="text-align: center;"><small>※反対面もよくお読みください。</small></p> </div>	<div data-bbox="718 840 1165 1467" style="border: 1px dashed red; padding: 10px;"> <p>ルコナック® 爪外用液5%の使い方</p> <p>ご注意ください  目には使用しないでください。  使用・保存の際には火気を避けてください。</p> <p>使用前:患部を清潔にしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 初回使用(開封)時、キャップをしたまま、図のように5~10回ほど振り、薬液を先端のフェルト部分*にしみ込ませてください。 <small>*先端のフェルト部分</small> 2 1日1回、爪の表面だけでなく、爪と指の間に薬液が行きわたるように爪全体に塗ってください。 <small>※薬液が出ない場合は、キャップをしめてからさらに2,3回振ってください。 ※先端のフェルト部分は固定されていますので、強く押し込まないでください。</small> 3 爪の周りの皮膚についた薬液は、ティッシュペーパーや綿棒などでふき取ってください。 4 塗り終わったら、容器の周りをティッシュペーパーなどできれいにふき取り、キャップをしめ、立てた状態で保管してください。 <p style="text-align: center;"><small>※2回目からはこの操作は不要です。</small></p> <p style="text-align: center;"><small>医師・薬剤師の指示の通りに使用しましょう。</small></p> <p style="text-align: center;"><small>※反対面もよくお読みください。</small></p> </div> <p data-bbox="1197 1041 1436 1164">主に初回使用方法、塗布方法について変更しております。</p>

④ 天地無用マークを個装箱に追加いたします。

新容器

先端に薬液が過剰に浸潤することを防ぐ為、立てて保管ください。



★横にしないでください。



■ 識別方法


当分の間、変更品の個装箱に **容器変更品** と表示いたします。個装箱内に下記のような患者様向けお知らせ文書を封入いたします。

お知らせ

容器が変わりました。
中身の成分は従来品と変わりありません。

⑤ 会社名、ロゴが変更になります。

包装	容器	個装箱	元梱包箱
3.5g(4mL)×5本	会社名、住所	ロゴ、会社名、住所	会社名
3.5g(4mL)×10本			

項目	現行品	変更品
会社名 住所	株式会社 ポーラファルマ 東京都品川区西五反田8-9-5	サンファーマ株式会社 東京都港区芝公園1-7-6
ロゴ	POLA PHARMA	



サンファーマ株式会社
東京都港区芝公園1-7-6