

— 患者様へご使用にあたっての留意事項 —

安全にご使用いただくために重要な情報です。  
必ずお読みください。

テグレトール錠 100mg、テグレトール錠 200mg、テグレトール細粒 50%  
(カルバマゼピン製剤)

抗てんかん発作薬を服用しているてんかんのある人において、  
自動車運転や危険を伴う機械操作を行う際の留意事項

抗てんかん発作薬を使用する際には、以下の点に留意すること。

b. 抗てんかん発作薬を服用するものが注意すべきこと

1. てんかんと診断され、抗てんかん発作薬による治療が施されている者で、自動車運転等を希望する際には、医師により十分な発作抑制効果と運転等に支障を来す副作用がないことが確認され、かつ許可されなくてはならない。
2. ストレス、睡眠不足、発熱、疲労に代表される個別のてんかん発作誘発要因を回避できない際には、自動車運転等は行わないこと。
3. 医師の処方通りに服薬すること。また服薬に際しては医師や薬剤師による指導の内容を遵守すること。
4. 抗てんかん発作薬の服用により、めまい、眠気、運動失調に代表される自動車運転等に影響を与える副作用が発生する事があるので、これらの自覚症状が生じた際には、自動車運転等を絶対に行わないこと。運転中にその様な状態になった際には、運転を速やかに中断すること。
5. てんかん以外の疾患や症状に対して処方を受ける際や市販薬を購入する際は、処方されている抗てんかん発作薬の効果や副作用に対する影響について、医師や薬剤師に確認すること。

【お問い合わせ先】 くすり相談センター：(電話番号) 0120-22-6880  
受付時間：9:00~17:00 (土・日・祝日、その他当社の休業日を除く)  
ホームページ：URL (<https://jp.sunpharma.com/contact>)

TEG061PV63

